

Objet	Domaine d'application
Ce mode opératoire précise les modalités d'antibioprophylaxie retenues en chirurgie digestive	L'ensemble des services de chirurgie, bloc opératoire et le service d'anesthésiologie de la cité sanitaire de Saint-Nazaire.

Processus

Acte chirurgical	Produit	Posologie	Réinjection et durée	Poids>100kg
Cholecystectomie Chirurgie oesophagienne (sans plastie colique) Chirurgie gastroduodénale Chirurgie pancréatique Chirurgie hépatique Chirurgie des voies biliaires (sans prothèse) Cure d'événtration AVEC OU SANS mise en place d'une plaque prothétique Cure de hernie inguinale AVEC mise en place d'une plaque prothétique Réduction du tablier abdominal	Céfazoline	2g IVL	1g si durée> 4h	Si poids > 100kg, doubler les doses sauf pour Gentamicine (5mg/kg, dose max 500mg), Clindamycine (1200mg)
	Allergie : Clindamycine + Gentamicine	900mg IVL 5 mg/kg IVL	Si durée > à 4h réinjecter 600mg Dose unique	
Chirurgie de l'intestin grêle ou colo-rectale, plastie colique Anastomose bilio-digestive Prolapsus Plaie de l'abdomen Chirurgie appendiculaire (appendice sain peu inflammatoire) - Si constatation per-opératoires septiques : antibiothérapie curative, cf protocole infections digestives	Cefazoline + Ornidazole Allergie : Gentamicine + Ornidazole	2g IVL 1g en perf 5 mg/kg 1g en perf	1g si durée> 4h Dose unique Dose unique Dose unique	
Chirurgie proctologique	Ornidazole	1g en perf	Dose unique	
Cure de hernie inguinale SANS mise en place d'une plaque prothétique	Pas d' ABP			
Chirurgie bariatrique (Sleeve ou Bypass)	Cefazoline + Ornidazole Allergie : Clindamycine + Gentamicine	4g 1g 1200mg 5mg/kg (max 500mg)	Si durée>à 2h, réinjecter 2g Dose unique Dose unique Dose unique	

	Nom - Fonction	Date	Visa
Rédacteur	J. BROCHARD, Infectiologue	31/05/18	
Vérificateur	MA LETARD de la BOURALIERE, médecin anesthésiste Commission Antibiotiques		
Approbateur	J. HOFF, Référent « antibiotiques »	03/08/18	<i>Signé</i>
Approbation par la cellule qualité et risques pour mise en application le			18/08/18