

ANTIBIOPROPHYLAXIE EN OBSTETRIQUE

Objet	Domaine d'application
Ce mode opératoire précise les modalités d'antibioprophylaxie retenues en obstétrique	L'ensemble des services de chirurgie, bloc opératoire et le service d'anesthésiologie de la cité sanitaire de Saint-Nazaire.

Processus

Acte chirurgical	Produit	Posologie	Réinjection et durée	Poids > 100kg
Césarienne	Céfazoline	2g IVL	Dose unique 30 minutes avant incision	Si poids > 100kg, doubler la dose de Cefazoline, 1200 mg de Clindamycine
	Allergie : Clindamycine	900mg	Dose unique 30 minutes avant incision	
<ul style="list-style-type: none"> • Délivrance artificielle • Révision utérine • Hémorragie de la délivrance 	Céfazoline	2g IVL	Dose unique	
	Allergie : Clindamycine	900mg	Dose unique	

	Nom - Fonction	Date	Visa
Rédacteur	J. BROCHARD, Infectiologue	31/05/18	
Vérificateur	MA LETARD de la BOURALIERE, médecin anesthésiste Commission Antibiotiques		
Approbateur	J. HOFF, Référent « antibiotiques »	03/08/18	<i>Signé</i>
Approbation par la cellule qualité et risques pour mise en application le			18/08/18

PEC-MO-039 (CHSN) ARE/MO-011 (CLME)	ANTIBIOPROPHYLAXIE EN OBSTETRIQUE	Version 2	Page 1 sur 1
--	-----------------------------------	-----------	--------------