

ANTIBIOPROPHYLAXIE EN CHIRURGIE PLASTIQUE ET RECONSTRUCTRICE

Objet	Domaine d'application
-------	-----------------------

Ce mode opératoire précise les modalités d'antibioprophylaxie retenues en chirurgie plastique et reconstructrice.	L'ensemble des services de chirurgie, bloc opératoire et le service d'anesthésiologie de la Cité Sanitaire de Saint-Nazaire.
---	--

Processus

Acte chirurgical	Produit	Dose initiale	Ré-injections et durée	Poids > 100kg
Blépharoplastie Greffe de peau mince Lifting cervico-facial Lipome Otoplastie Petite chirurgie cutanée avec greffe ou lambeau local	Pas d'antibioprophylaxie			Si poids > 100kg, doubler les doses sauf pour Clindamycine (1200mg) et Gentamycine
Bodylift Brachioplastie Cure de ptôse avec ou sans prothèses mammaires Cruoplastie Prothèses mammaires Dermolipectomie abdominale Lambeau d'escarre Lipoaspiration Lipomodelage Lambeau pédiculé de grande taille Lambeau libre Minilift abdominal Réduction mammaire	Céfazoline	2g IVL	1g si durée > 4h	
	Allergie : Clindamycine + Gentamycine	900mg IVL 5 mg/kg	600mg si durée > 4h	
Chirurgie de classe 2 d'Altemeier : (rupture d'asepsie minime)	Céfazoline	2g IVL	1g si durée > 4h	
	Allergie : Clindamycine	900mg IVL	600mg si durée > 4h	

	Nom - Fonction	Date	Visa
Rédacteur	MA LETARD de la BOURALIERE, médecin anesthésiste	25/01/18	
Vérificateur	Commission Antibiotiques	24/04/18	
Approbateur	J. BROCHARD, Référent « antibiotiques »	09/01/19	<i>Signé</i>
Approbation par la cellule qualité et risques pour mise en application le			24/01/19