

Commission des antibiotiques

Objet	Domaine d'application
Ce mode opératoire précise les modalités d'antibioprophylaxie retenues en prophylaxie de l'endocardite infectieuse	L'ensemble des services de chirurgie, bloc opératoire et le service d'anesthésiologie de la cité sanitaire de Saint-Nazaire.

Processus

En cas de :

- Chirurgie dentaire à risque : uniquement si intervention gingivale ou de la région péri-apicale de la dent ou perforation de la muqueuse orale

ET

- Cardiopathie à haut risque
 - Valve prothétique ou matériel prothétique utilisé pour une réparation valvulaire
 - Antécédent d'endocardite infectieuse
 - Cardiopathie congénitale :
 - Cyanogène non opérée ou mise en place d'une dérivation chirurgicale
 - Cardiopathie congénitale avec réparation prothétique, placée chirurgicalement ou percutanée, jusqu'à 6 mois après la mise en place
 - Avec fuite résiduelle au site d'implantation d'un matériel prothétique, mise en place chirurgicalement ou par voie percutanée

Autres interventions : pas de prophylaxie de l'endocardite

Acte chirurgical	Produit	Posologie adultes	Posologie enfants	Poids>100kg
Chirurgie dentaire à risque +	Amoxicilline	2 g PO ou IV 30 à 60 min avant l'intervention	50 mg/kg PO ou IV 30 à 60 min avant l'intervention	Si poids > 100kg, doubler les doses sauf pour Clindamycine (1200mg)
	Cardiopathie à haut risque	Allergie : Clindamycine 600mg PO ou IV 30 à 60 min avant l'intervention	20mg/kg PO ou IV 30 à 60 min avant l'intervention	

	Nom - Fonction	Date	Visa
Rédacteur	MA LETARD de la BOURALIERE, médecin anesthésiste	31/05/18	
Vérificateur	Commission Antibiotiques		
Approbateur	J. HOFF, Référent « antibiotiques »	27/12/18	Signé
Approbation par la cellule qualité et risques pour mise en application le			11/01/19

PEC-MO-040 (CHSN) ARE/MO-012 (CLME)	PROPHYLAXIE DE L'ENDOCARDITE INFECTIEUSE	Version 2	Page 1 sur 1
--	--	-----------	--------------